

사용상의주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.

- 1) 이 약 또는 이 약 성분에 과민증의 병력이 있는 환자
- 2) 아스피린 또는 기타의 비스테로이드 소염(항염)진통제에 천식 또는 그 병력이 있는 환자(천식 발작을 일으킬 수 있다.)
- 3) 아스피린 또는 기타의 비스테로이드 소염(항염)진통제에 과민증 환자
- 4) 18세 미만의 소아
- 5) 임신 5개월이 경과한 임부
- 6) 수유부
- 7) 소화궤양환자

2. 이 약을 사용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것.

이 약을 사용하는 동안 디클로페낙 제제나 비스테로이드 소염제(항염증제)를 국소적으로 적용하거나 복용하지 않는다.

3. 이 약을 사용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.

- 1) 연속 7일 이상 사용하지 않는다.
- 2) 병변(병에 의한 몸의 변화)이 있는 피부(삼출피부염, 습진, 감염된 병변, 화상, 상처 등)에는 사용하지 않는다.
- 3) 눈 및 점막에는 사용하지 않는다.
- 4) 의사의 감독 없이 밀봉붕대법을 사용하지 않는다.

4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 사용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 기관지 천식 환자(천식 발작을 일으킬 수 있다.)
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 사람

뉴퀴놀론계 항균제(에녹사신 등)와 병용(함께 복용(사용))시 경련을 일으킬 우려가 있으므로 경련이 나타난 경우에는 기도를 확보하고, 디아제팜의 정맥주사 등의 처치를 할 것(뉴퀴놀론계 항균제가 뇌안의 억제성 신경 전달물질인 GABA의 수용체 결합을 농도 의존적으로 저해하고, 일부 비스테로이드소염(항염)제와의 공존 하에서는 그 저해작용이 증강되는 것이 동물실험으로 보고되었다).

3) 임부 및 수유부

임신 또는 수유 중이거나 임신가능성이 있는 환자의 경우 이 약을 사용하기 전에 의사 또는 약사와 상의한다.

(1) 임신 3기 : 프로스타글란딘 합성저해로 인해 출산이 지연될 수 있으며, 출산시 실혈, 신생아출혈, 태아의 심폐독성(동맥관 조기폐쇄를 수반하는 폐고혈압), 신기능 저하로 양수과소증을 수반하는 신부전 등이 나타날 수 있으므로 이 시기의 임부는 사용하지 않는다.

(2) 임신 1기 및 2기: 임신 중 이 약의 사용 관련 임상자료는 없다. 경구 투여 대비 전신 노출의 정도는 더 낮으나, 국소 투여 후 이 약의 전신 노출이 배아/태아에게 유해할 수 있는지 여부는 확인되지 않았다. 이 약은 반드시 필요한 경우 최단기간 최저 용량으로 투여한다.

(2) 수유부: 영아(젖먹이)에 대한 위해 여부는 아직 밝혀진 바 없으나 이 약이 모유로 이행하므로 수유부는 사용하지 않는다.

4) 고령자(노인)

5. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.

상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 피부 : 광선과민반응, 부종(부기), 피부박탈, 습진, 피부건조, 때때로 피부염, 가려움, 충혈되어 붉어짐, 거칠어짐, 자극감, 드물게 수포형성, 색소침착 등 특히, 중대한 이상반응으로 접촉피부염은

이 약을 사용한 부위에 충혈되어 붉어짐, 붉은 반점, 발진, 가려움, 통증 등의 피부 증상이 나타나 부종(부기), 수포, 미란(짓무름) 등으로 악화되며, 나아가 전신으로 확대되어 심해질 수 있으므로 이상이 확인된 경우에는 즉시 사용을 중지하고, 적절한 처치를 한다.

2) 기타 : 매우 드물게 과민반응, 혈관신경부종(부기), 천식 등

3) 장기간 또는 과량투여시 전신 이상반응 가능성을 배제할 수 없다.

6. 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항

이 약은 통증과 부기 등의 원인이 되는 질병을 치료하는 것이 아니라 통증과 부기 등의 증상만을 치료하는 약 이므로 증상이 있는 경우에만 사용한다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관한다.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.