

용법용량

1. 투여시 주의사항

- 1) 절대 림프구수(ALC; absolute lymphocyte count) 500 cells/mm^3 미만, 절대호중구수(ANC; absolute neutrophil count) $1,000 \text{ cells/mm}^3$ 미만, 또는 헤모글로빈 수치 9 g/dL 미만인 환자에게는 이 약의 투여를 시작하지 않는다.
- 2) 이 약의 투여 전, 투여 중 및 투여 후 결핵을 포함한 감염에 대해 면밀히 모니터링해야 하며, 중대한 감염이 발생한 환자는 감염이 조절될 때까지 이 약의 투여를 중단해야 한다.
- 3) 림프구 감소, 호중구 감소 및 빈혈의 조절을 위해 일시적으로 이 약의 투여를 중단하는 것이 필요할 수 있다.
- 4) 이 약은 음식물 섭취와 상관없이 경구 투여할 수 있다.

2. 류마티스 관절염, 건선성 관절염 및 강직성 척추염의 권장용량

이 약의 권장용량은 1회 5mg, 1일 2회 투여이다.

CYP2C19 및/또는 CYP3A4 억제제를 투여중인 환자, 중등도 및 중증 신장장애 환자, 중등도 간장애 환자, 림프구 감소, 호중구 감소 및 빈혈 환자에 대한 성인 권장용량은 표1과 같다.

[표 1] 류마티스 관절염¹, 건선성 관절염² 및 강직성 척추염³ 환자에 대한 이 약의 권장용량

| | 이 약 |
|--|--|
| 성인 | 1회 5 mg, 1일 2회 투여 |
| 다음과 같은 약물을 투여중인 환자: -강력한 CYP3A4 억제제(예, 케토코나졸), 또는 -중등도의 CYP3A4 억제제 및 강력한 CYP2C19 억제제(예, 플루코나졸) | 1회 5 mg, 1일 1회 투여 |
| 다음의 환자에서: -중등증 또는 중증의 신장장애 환자 -중등증의 간장애 환자* | 1회 5 mg, 1일 1회 투여 |
| [‘5. 일반적주의’항 참조] | |
| ALC 500 cells/mm^3 미만 (반복검사로 확인) | 투여 중단 |
| ANC $500\text{-}1,000 \text{ cells/mm}^3$ | 투여 잠정 중단. ANC가 $1,000 \text{ cells/mm}^3$ 초과가 되면, 이 약 1회 5 mg 1일 2회로 다시 투여한다. |
| | |

| | |
|--|-------------------------------|
| ANC 500 cells/mm ³ 미만 | 투여 중단 |
| 헤모글로빈 수치가 2 g/dL 초과와 감소 또는 8.0 g/dL 미만 | 헤모글로빈 수치가 정상이 될 때까지 투여를 잠정 중단 |

¹ 류마티스 관절염 환자에 이 약은 단독투여 또는 메토티렉세이트 및 다른 비생물학적 항류마티스제제와 병용투여한다.

² 건선성 관절염 환자에 이 약은 비생물학적 항류마티스제제(DMARDs)와 병용투여한다. 건선성 관절염 환자에 대한 이 약 단독요법의 유효성은 연구되지 않았다.

³ 강직성 척추염의 임상적 개선은 이 약 투여 시작 후 16주 내에 관찰되었다. 이 기간 내에 임상적 개선을 보이지 않는 환자의 경우 지속적인 투여를 신중하게 고려해야 한다.

3. 궤양성 대장염의 권장용량

CYP2C19 및/또는 CYP3A4 억제제를 투여중인 환자, 중등도 및 중증 신장애 환자, 중등도 간장애 환자, 림프구 감소, 호중구 감소 및 빈혈 환자에 대한 성인 권장용량은 표2와 같다.

[표 2] 궤양성 대장염 환자에 대한 이 약의 권장용량

| 궤양성 대장염 | 이 약 |
|--|--|
| 성인 | 1회 10 mg 1일 2회로 최소 8주동안 투여 후, 치료반응에 따라 5 mg 또는 10 mg을 1일 2회 투여한다. ['12. 전문가를 위한 정보' 참조] 유지용량으로 최소 유효용량을 사용한다. 이 약 1회 10 mg을 1일 2회로 16주동안 투여한 후에도 적절한 치료적 유의성을 보이지 않으면 투여를 중단한다. |
| 다음과 같은 약물을 투여중인 환자: -강력한 CYP3A4 억제제(예, 케토코나졸), 또는 -중등도의 CYP3A4 억제제 및 강력한 CYP2C19 억제제(예, 플루코나졸) | 이 약 1회 10 mg을 1일 2회로 투여중인 경우, 1회 5 mg 1일 2회로 감량한다. 이 약 1 회 5 mg 1일 2회로 투여중인 경우, 1일 1회 5 mg으로 감량한다. |
| 다음의 환자에서: -중등증 또는 중증의 신장애 환자 -중등증의 간장애 환자 ['5. 일반적주의'항 참조] | 이 약 1회 10 mg 1일 2회로 투여중인 경우, 1회 5 mg 1일 2회로 감량한다. 이 약 1회 5 mg 1일 2회로 투여중인 경우, 1일 1회 5 mg으로 감량한다. |
| ALC 500 cells/mm ³ 미만 (반복검사로 확인) | 투여 중단 |
| ANC 500-1,000 cells/mm ³ | 이 약 1회 10 mg을 1일 2회 투여한 경우, 1회 5 mg 1일 2회로 감량한다. ANC가 1,000 cells/mm ³ 초과가 되면, 임상적 반응에 따라 이 약 1회 10 mg 1일 2회로 다시 증량한다. 기준에 이 약 1회 5 mg을 1일 2회로 투여한 경우, 투여를 잠정 중단한다. |

| | |
|--|--|
| | ANC가 1,000 cells/mm ³ 초과가 되면, 이 약 1회 5 mg 1일 2회로 다시 투여한다. |
| ANC 500 cells/mm ³ 미만 | 투여 중단 |
| 헤모글로빈 수치가 2 g/dL 초과와 감소 또는 8.0 g/dL 미만 | 헤모글로빈 수치가 정상이 될 때까지 투여 잠정 중단 |

정맥혈전색전증(VTE), 주요 심혈관계 이상반응(MACE) 및 악성종양의 위험 인자가 있는 환자의 경우 이용 가능한 치료제 유무에 상관없이 유지요법으로 10mg은 권장하지 않는다.