

## 사용상의주의사항

### 1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 기타의 플루르비프로펜 제제에 과민증의 병력이 있는 환자
- 2) 아스피린 천식(비스테로이드성 소염[항염]진통제 등에 의한 천식발작의 유발) 또는 그 병력이 있는 환자 (천식발작을 일으킬 수 있습니다)

### 2. 다음 환자에는 신중히 투여 하십시오.

기관지 천식 환자(천식발작을 일으킬 수 있습니다)

### 3. 부작용

- 1) 때때로 발적[충혈되어 붉어짐], 발진, 약진[약물발진], 가려움 및 작열감[화끈감], 점 촉피부염이 나타날 수 있으며 이러한 증상이 나타날 경우에는 사용을 중지하십시오.
- 2) 천식발작을 유발할 수 있으므로 건성수포음[거품소리], 천명[숨을 쉼썩거림], 호흡 곤란 등의 초기증상이 나타날 경우에는 사용을 중지하십시오. 천식발작은 이 약의 부착 후 수시간 내에 나타납니다.

### 4. 일반적주의

- 1) 소염[항염]진통제에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법[증상별로 치료하는 방법] 임에 유의합니다.
- 2) 피부감염증을 불현성화[겉으로 드러나지않게] 시킬 수 있으므로 감염을 수반하는 염증에 사용하는 경우에는 적절한 항균제 또는 항진균[곰팡이]제를 병용[함께 사용]하고 충분히 관찰하여 신중히 투여하십시오.
- 3) 만성질환(퇴행성관절염[골관절염] 등)에 이 약을 사용할 경우에는 약물요법 이외 의 요법도 고려하십시오. 또한 환자의 상태를 충분히 관찰하여 부작용 발현[드러 냄]에 유의하십시오.

### 5. 임부에 대한 투여

임신 제 1,2 삼분기에는 명백히 필요한 경우를 제외하고 플루르비프로펜을 사용해서는 안되며, 치료상의 유익성이 위험성을 상회[웃돌]한다고 판단될 경우에만 투여하십시오. 사용하는 경우 복용량을 낮게 유지하고 치료 기간을 최대한 짧게 유지하십시오.

임신 제 3 삼분기 동안 플루르비프로펜을 포함한 프로스타글란딘 합성효소 억제제를 전신적으로 사용하면 태아에게 심폐 및 신장 독성을 유발할 수 있으며, 임신 말기에는 산모와 아이 모두 출혈 시간이 길어지고 진통이 지연될 수 있다. 따라서 플루르비프로펜은 임신 후기에는 투여하지 마십시오.

#### 6. 소아에 대한 투여

소아에는 안전성이 확립되어 있지 않습니다(사용경험이 적습니다).

#### 7. 고령자[노인]에 대한 투여

고령자[노인]에는 이 약의 부착 부위의 피부상태에 주의하며 신중히 투여하십시오.

#### 8. 적용상의 주의

- 1) 손상된 피부와 점막에는 사용하지 마십시오.
- 2) 습진 또는 발진부위에는 사용하지 마십시오.
- 3) 적용부위의 땀을 닦아낸 후 사용하십시오.