

# 사용상의주의사항

## 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것

- 1) 이 약 및 이 약 성분에 과민증 환자
- 2) 갑상선기능 이상 환자
- 3) 6세 미만의 소아
- 4) 방사성요오드 치료중 및 치료전후

## 2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 입안이 심하게 헐은 환자
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 사람 및 수유부

## 3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

- 1) 과민증: 과민증(발진 등), 아나필락시양 증상이 나타나는 경우에는 사용을 중단한다.
- 2) 구강(입안) : 때때로 구강(입안), 인두의 자극감, 드물게 구강(입안)점막미란(잇무름), 입안의 혈음 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 3) 소화기계: 때때로 구역 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 4) 피부: 드물게 접촉 피부염, 매우 드물게 혈관부종 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 5) 호흡기계: 폐렴 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 6) 내분비계: 매우드물게 갑상선 기능 항진증\*(때로는 빈맥 또는 동요), 빈도 알수없음 갑상선 기능 저하증  
\*\*
- 7) 기타: 드물게 불쾌감이 나타날 수 있다.

\* : 갑상선질환의 병력이 있는 환자에서 다량의 요오드 섭취 (예. 상처나 화상의 치료를 위하여 넓은 피부면적에 포비돈요오드 장기사용)

\*\* : 포비돈요오드의 장기간 또는 광범위한 사용

#### 4. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 지킨다.
- 2) 소아에 사용할 때에는 보호자의 지도, 감독하에 사용한다.
- 3) 구강(입안)용으로만 사용한다.
- 4) 발치(이를 뽑음)후 등 구강 창상(입안 상처)의 경우 혈액이 응고하여 출혈이 멎기 전에는 격렬한 양치를 피한다.
- 5) 이 약은 섬광촬영술을 이용한 갑상선진단에 영향을 줄 수 있으므로 이 약의 투여와 섬광도 조사는 4주의 간격을 두고 실시한다. 또한 이 약의 투여중에는 갑상선 기능이 가역적으로 변화될 수 있으므로 주의한다.
- 6) 드물게 속(아나필락시(과민성))이 일어날 수 있으므로 사용후 갑자기 가려움, 부종(부기), 가슴쓰림 등과 동시에 안색창백, 수족냉감(손발이 차가움), 식은 땀, 숨가쁨 등의 중증의 증상이 나타나는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받는다.
- 7) 소독용으로 이 약을 과량 사용시 요오드 독성이 있다.
- 8) 의복 등에 묻은 경우 바로 세척하면 물로 쉽게 씻겨진다.
- 9) 실수로 과량을 삼켰거나 눈에 들어간 경우 즉시 조치를 취한다.
- 10) 장신구(특히 은을 포함한 제품)에 닿지 않도록 주의한다.
- 11) 증상이 개선되지 않거나 악화되는 경우 의사와 상의한다.

#### 5. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사일광을 피하여 보존한다.
- 3) 원래의 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.
- 4) 사용 전 열을 가하지 않는다.