

사용상의주의사항

1. 다음 환자(부위)에는 사용하지 말 것.

- 1) 이 약에 과민증 또는 그 병력이 있는 환자
- 2) 눈, 눈 주위

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 사람
- 2) 약물 또는 화장품등에 의해 알레르기 증상의 병력이 있는 환자
- 3) 습윤이나 짓무름이 심한 사람

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부 문서를 소지할 것.

- 1) 국소적인 피부자극감(예: 발진(충혈되어 붉어짐), 가려움, 건조, 작열감(화끈감), 자극감(따끔따끔), 부기)
- 2) 증상의 개선이 나타나지 않을 경우에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.

4. 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항

- 1) 여드름, 뾰루지가 있는 부분에만 사용하고 주변의 넓은 부분이나 눈 주위, 깊은 상처와 심한 화상에는 사용하지 않는다.
- 2) 눈에 들어가지 않도록 주의한다. 만일, 눈에 들어간 경우에는 즉시 물 또는 미지근한 물로 씻어준다. 자극이 지속되는 경우 의사 또는 약사와 상의한다.
- 3) 이 약은 외용으로만 사용하고, 이 약의 정해진 용법용량을 잘 지킨다.
- 4) 적용부위 이외의 피부에 닿지 않도록 주의한다.
- 5) 실수로 이 약을 복용한 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
- 6) 광범위 병소에 적용하는 경우에는 부작용이 나타나기 쉬우므로 주의하여 사용한다.
- 7) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

5. 임부에 대한 투여

1) 임신 1기와 2기에는 꼭 필요하지 않는 이상 사용하지 않도록 한다. 사용할 경우 가능한 최저용량으로 최단 기간 투여한다. 임신 3기에 이 약을 사용할 경우 프로스타글란딘 합성저해로 인해 출산이 지연될 수 있으며 출산시 실혈, 신생아 출혈, 태아의 심폐독성(동맥관 조기폐쇄를 수반하는 폐고혈압), 신기능저하로 양수과소증을 수반하는 신부전 등이 나타날 수 있으므로 이 시기의 임부에는 사용하지 않는다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사일광을 피하고 가능한 한 서늘한 곳에 마개를 닫아 보관한다.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.
- 4) 사용기간을 넘긴 제품은 사용하지 않는다.